

**Surface :** 763

**Altitude :**

**Entité paysagère :**


VALOIS MULTIEN.

**Canton(s) concerné(s) :**

Betz.

**Commune(s) concernée(s) :**

LA VILLENEUVE-SOUS-THURY, MAREUIL-SUR-OURCQ, MAROLLES, NEUFCHELLES, VARINFROY.



### Inscription à inventaire, statut de protection :

APPB, ZICO, ZNIEFF I, ZNIEFF II.

### Valeur patrimoniale

- ☐ Intérêt pour la Faune
- ☐ Intérêt pour la Flore
- ☐ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage


### Vocation proposée



### Présentation du Grand Ensemble Naturel Sensible (GENS)


La vallée de l'Ourcq, dans sa portion située à cheval sur les départements de l'Oise et de l'Aisne, est encaissée dans le plateau tertiaire du Valois. Sur ce tronçon, elle suit une orientation globalement nord-est / sud-ouest. Elle est essentiellement développée sur un substrat de tourbe alcaline. Celle-ci résulte de la non décomposition des débris végétaux accumulés dans des conditions anoxiques de sols engorgés. Cette tourbe a été exploitée en plusieurs endroits, générant la présence d'étangs plus ou moins nombreux, issus des entailles d'extraction, notamment vers Bourneville et la Queue d'Ham. Des roselières, scirpaies, mégaphorbiaies et cladiaies frangent ces plans d'eau.





 Délimitation du GENS

0 850 1 700 m





## Description et intérêt du Grand Ensemble Naturel Sensible

### DESCRIPTION ECOLOGIQUE

#### Composition

##### Milieus naturels dominants

On note la présence des milieux paludicoles suivants : végétation aquatique comprenant avec divers groupements du *Nymphaea alba*, du *Lemna gibba* et du *Potamogeton pectinatus*, et des herbiers à Characées (*Chara* spp.), roselières (*Phragmites* spp.) notamment, et *Sagittaria arifolia* sur les terrains plus atterrés, cariçaies et cladiaies (*Cladium mariscus*), faciès pionniers sur tourbe de l'*Anagallis tenella*-*Eleocharis acicularis*, et jonchaies du *Juncus subnodulosus*-*Caricion lasiocarpae*, mégaphorbiaies (*Thalictrum flavum*-*Althaea officinalis* à *Sonchus palustris*), bas-marais du *Silene caroliniana*-*Juncus subnodulosus*. Sur les derniers espaces ouverts, les fourrés de saules ont tendance à se développer et à devenir envahissants en l'absence d'entretien.

Les plantations de peupliers ont remplacé la majorité des milieux paludicoles. Les prairies humides ont ainsi disparu de la vallée de l'Ourcq. Seules subsistent quelques mégaphorbiaies ou portions de roselières éparses. Le canal de l'Ourcq longe la rivière. Autrefois très usité pour le transport fluvial à destination de Paris, il a aujourd'hui une vocation touristique. Le cours de l'Ourcq présente localement des tronçons relativement rapides avec des substrats sableux encore non envahis.

##### Espèces végétales remarquables

##### Espèces animales remarquables

#### Organisation, fonctionnement et état de conservation

##### Agencement et connexion des milieux dans le site

##### Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

##### Etat de conservation et fragilité du site

### DESCRIPTION PAYSAGERE

### DESCRIPTION SOCIALE



## Usage et gestion du Grand Ensemble Naturel Sensible

*Principaux usages et activités sur le site*

*Principales activités aux alentours*

*Fréquentation*

*Réglementations diverses*

*Foncier*

*Présence de bâtiments*

*Gestion et valorisation actuelles*

*Dégradation et menaces*

## Historique et piste d'actions

*Date d'intégration*

*Pistes d'actions*

*Etat d'avancement*

*Maitre d'ouvrage choisi*